


Het geriatrisch vestibulair syndroom



Het geriatrisch vestibulair syndroom (GVS) is een neurologische aandoening die vaker voorkomt bij oude(re) honden. Vandaar de toevoeging 'geriatrisch', wat zo veel betekent als 'met betrekking op ouderen en ouderdomsziekten'. Het geriatrisch vestibulair syndroom komt iets meer voor bij grotere hondenrassen, maar het kan in principe bij elke hond voorkomen, dus ook bij kleine hondenrassen. GVS treedt plotseling op en de symptomen kunnen erg heftig zijn. Veel mensen denken aan een hersenbloeding of een TIA, maar die zijn bij honden zeldzaam.

Wat is GVS?



GVS is een clustering van neurologische verschijnselen, veroorzaakt door het disfunctioneren van het vestibulaire systeem of evenwichtsorgaan. Het evenwichtsorgaan zorgt voor de balans en coördineert de positie van het hoofd, de ogen, de nek en de ledematen. GVS kan zowel in de nabijheid (periferie) als in het centrum van het evenwichtsorgaan zitten. Het is belangrijk om bij een neurologisch

onderzoek uit te zoeken waar de beschadiging zit, omdat de behandeling afhankelijk is van de locatie.

Bij periferaal GVS worden meestal ontsteking van het inwendige oor, een middenoorontsteking, hypothyroïdie (te snel werkende schildklier), neuspoliepen, trauma of gewoon ouderdomsverschijnselen aangetroffen. Bij centraal GVS worden cysten aangetroffen, syringomyelia of andere Chiari-achtige afwijkingen (hersenaafwijkingen, zoals bij zoals Cavalier King Charles Spaniel), hypothyroïdie, cushing (bijnierziekte), kanker of een medicijnvergiftiging.

Symptomen

De symptomen van GVS zijn:

- nystagmus (de ogen van de hond bewegen razendsnel heen en weer),
- scheve kop,
- omvallen en cirkelen,
- braken en misselijkheid,
- erg onrustig,
- niet meer overeind kunnen komen.

Zoals gezegd wordt er vaak aan een hersenbloeding, TIA of hersentumor gedacht. Maar een hersenbloeding is zeer zeldzaam bij honden en zal zich nooit alleen beperken tot het evenwichtsorgaan (net als een tumor).

Behandeling

Er zijn geen medicijnen tegen GVS. De aandoening treedt acuut op, maar verdwijnt normaal gesproken ook weer snel. Na 24-78 uur is er al een aanzienlijke verbetering opgetreden. De klachten verdwijnen normaliter na 7-14 dagen. Medicatie tegen de misselijkheid kan wel verlichting geven. Mocht er een onderliggende infectie of ziekte (zie hierboven) zijn, kan die uiteraard wel bestreden worden. Een simpele bloedtest en/of urinetest kan hier al uitsluitsel over geven. Sommige dierenartsen schrijven prednison voor bij GVS, maar in de regel is dat niet nodig omdat de symptomen meestal vanzelf weer verdwijnen. Zorg er wel voor dat de hond zich niet kan bezeeren. Een zachte, stoffen bench kan de hond beschermen.

Bronnen

1. Blackwell's five-minute Veterinary consult: canine and feline, Larry P. Tilley, and Francis WK Smith Jr, eds. John Wiley & Sons, 2011.
2. Proposed Treatment for Geriatric Vestibular Disease in Dogs. M. Kraeling, Topics in companion animal medicine, 2014.
3. Vestibular syndrome: What's causing the head tilt and other neurologic signs?, H. Rylander, 2012.



Schotse Herder

VRIENDEN